

# MAQS<sup>®</sup> Beehive strips ad us. vet.

Imprägnierter Ameisensäurestreifen, zur Sommerbehandlung



Anwendungszeitpunkt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

- Wirkt bis in die verdeckelte Brut
- Wirkt von 10 °C bis 29,5 °C
- Schnelle Wirkung bei hohem Befall

## Anwendung

- ✓ Nach der Honigernte für 7–10 Tage
- ✓ Flugloch immer komplett öffnen
- ✓ Bei Magazine Gitterböden nicht schliessen

## Dosierung

- ✓ **Für Schweizerkasten:**  
nur 1 Streifen direkt auf die Rahmen legen
- ✓ **1-Räumige Zander, DNM:**  
nur 1 Streifen auflegen
- ✓ **2-Räumige Zander, Langtroh und Dadant:**  
2 Streifen auflegen



### 1. Auspacken

MAQS Streifen auspacken, das Schutzpapier muss bleiben.



### 2. Auflegen

Mit Schutzhandschuhe, die Streifen direkt auf die Rähmchen legen.



### 3. Fertig

Nach 7–10 Tage können die Streifen entfernt und kompostiert werden